

Familia: Melastomataceae

Nombre común: Mayo

Arbol pequeño de hojas simples, enteras, opuestas, ápice agudo, bordes dentados, nervios curvos, lanceoladas, haz glabra, envés velloso; algunas con el pecíolo vellosa de 8 mm. de largo, limbo de - 8 cm. de largo y 3 cm. de ancho.

Flores terminales; cáliz formado por un tubo corto, vellosa de color verde, terminado en 5 lóbulos verdes, vellosa de 1 cm. de largo, estos lóbulos tienen a los lados desde la parte media a la base una expansión membranosa blanquecina papirácea. Corola de 5 pétalos morados, obovados, de ápice truncado con una pequeña escotadura, algunos de 3.9 cm. de ancho por 4.2 cm. de largo. Estilo de 2 mm. de diámetro y 2 cm. de largo, en las flores abiertas de color morado pálido, reamta en una cabeza pequeña, el estigma. Hipantio campanulado de color verde, vellosa exteriormente. Ovario libre dentro del hipantio, ovalado a globoso, 6 mm. de largo por 5 mm. de diámetro de 5 lóculos, exteriormente con costillas. Estambres 10, antera de base rojiza se prolonga en un espolón amarillento, el conjunto de 1.5 cm. de largo, filamento de 1 cm. de largo se adhiere a la antera en la parte donde se inicia el espolón; la antera dehiscente por un poro apical.

Arbol de follaje verde oscuro y abundante se cubre de flores moradas y violetas que le dan un gran valor ornamental. Se le ve en las orillas de los caminos, cerca de las casas, en las reliquias de vegetación y en las riberas de ríos y quebradas. Es común en las áreas - de Popayán (1800 m.), Rosario (1700 m.), Tunja (1700 m.) y Píndamo (1800 m.).



Z. E. Rames

Meriania speciosa

Miconia caudata (Bonpl.) DC.      Fig. 34

Familia: Melastomataceae


Nombre común: Lanzo, Danto.

Arbol pequeño de hojas opuestas, borde liso, el ápice termina en un largo apéndice, verdes por la haz y glabras, envés cubierto de un tomento café, aovadas, curvinervias y con los nervios prominentes por el envés, algunas de 18.5 cm. de largo por 11.5 cm. de ancho, pecíolo de color café 4.3 cm. de largo por 3mm. de ancho.

Flores dispuestas en panículas terminales de muchas flores con pedúnculos cubiertos de tomento café. Pétalos 5, blancos de 4 mm. de largo por 2 mm. de ancho, estilo blanco de 1 cm. de largo, remata en un estigma pequeño y capitado. Estambres en número de 10, filamentos amarillentos, anteras de color morado pálido, 5 mm. de largas.

Los frutos son bayas globosas, que al madurar toman un color morado oscuro casi negro, de 5 mm. de diámetro.

Esta especie es bastante común en los rastrojos, a orillas de caminos y vegetación riberana a las corrientes de agua en las tierras de Popayán (1800 m.), Santander de Quilichao (1100 m.), Mondomo (1500 m.) y El Tambo (1800 m.).



*Miconia caudata*

Familia: Melastomataceae

Nombre común: Mortiño

Arbol pequeño de hojas opuestas, simples, enteras, glabras, borde liso, ápice acuminado, lanceoladas, nervios laterales curvos, limbo de 15.5 cm. de largo por 5 cm. de ancho, pecíolo de 2.5 cm. de largo.

Las flores son abundantes y se disponen en panículas. Pétalos 8, a veces 7, blancos con un tinte rosado pálido, 1.2 cm. de largo por 0.6 cm. de ancho, tubo de cáliz corto y terminado en dientes pequeños; estilo blanco de 7 mm. de largo, estigma capitado y ovario libre dentro del hipantio, el cual es campanulado blanco con un tinte rosado pálido y 6 mm. de largo. Estambres 16 de filamento amarillo; anteras blancas se abren por un poro apical.

Los frutos van sobre pedúnculos de color rojo, son bayas globosas rojas, algunas se tornan morado oscuras, de 1 cm. de diámetro, llevan numerosas semillas pequeñas. Estas bayas se muestran achatadas apicalmente.

Arbolito muy frecuente en las cercas y rastrojos en las vecindades de Popayán (1.700 m.), Tunfa (1.800 m.), Paniquitá (1800 m.) y Timbio. En época de floración luce muy adornado con sus ramilletes de flores blanco-rosadas y es un bello atavío campesino en las orillas de caminos y veredas.



J.E. Romes.

*Miconia notabilis*

Fig. 35

Miconia rubiginosa (Bonpl.) DC.

Fig. 36


Familia: Melastomataceae

Nombre común : Mortiño

Arbusto de tallos cubiertos de un tomento de color ferrugíneo. Hojas opuestas, nervios laterales curvos, pecíolo grueso cubierto de pelos ferrugíneos, de 1 cm. de largo, limbo de bordes lisos, ápice acuminado, la haz glabrescente, envés densamente veloso ferrugíneo, lámina foliar oblonga a elíptica de unos 10.5 cm. de larga por 5. cm. de ancha.

Las flores tienen los pétalos blancos y se disponen en panículas de unos 13 - 15 cm. de largas.

Este arbusto se observa como integrante de la asociación vegetal que crece sobre los suelos rojos y erosionados cerca de Mondomo (1.500 m.), también se le ve en las proximidades de El Bordo (1.020 m.).-



ALR.

*Miconia rubiginosa*

Fig. 36



Miconia versicolor Naud.


Fig. 37

Familia: Melatomataceae

Arbusto de hojas opuestas, simples, curvinervias, glabras y verdes por la haz, envés gris y veloso, bordes dentados, ápice agudo, elípticas de 13.5 cm. de largas por 5.6 cm. de anchas - pecíolo de 2.2 cm. de largo.

Flores de pétalos blancos de unos 7 mm. de largas por 5 mm. de anchas, caliz de tubo corto, gris y veloso exteriormente; hipantio en forma de copa, 3 mm. de largo, veloso exteriormente y de color gris. Estambres de anteras amarillas dehiscentes por poros apicales, filamentos amarillentos de 5 mm. de largos, estilo 1 cm. de largo.

Este arbusto florece abundantemente y se le ve con frecuencia en las tierras de Tunfa (1.900. m.) y Silvia (2.500 m.).-



*Miconia versicolor*